

## MP2007 - Metastatický adenokarcinóm v mozgu

Objednávací kód: **4003.MP2007**



Cena bez DPH	265,00 Eur
Cena s DPH	320,65 Eur

Parametre

Množstevná jednotka	ks
---------------------	----

### Klinická história

56ročný muž podstúpil celkovú gastrektómiu a splenektómiu na adenokarcinóm žalúdka. V priebehu dvoch mesiacov sa u neho postupne vyvíjala nestabilná chôdza, stále väčšia slabosť v jeho ľavej ruke a bolesti hlavy v čelnej oblasti spojené s nevoľnosťou a zvracaním. Zobrazovacie metódy odhalili léziu v pravom čelnom laloku. Podstúpil kraniotómiu s resekciou lézie, ktorá potvrdila metastatický gastrický adenokarcinóm. Pociťoval postupne silnejúce príznaky a tiež žltáčku, zhoršujúce sa vedomie a papiloedém zo zvýšeného vnútrolebečného tlaku. Opakované zobrazovanie odhalilo opätovný výskyt pravej frontálnej metastatickej lézie a pečenej metastázy. Pacient zomrel 9 mesiacov po jeho počiatočnej operácii gastrektómie.

### Patológia

Táto vzorka mozgu je rezaná v koronálnej rovine. V pravom frontálnom laloku je viditeľný ohraničený, pestrý, ružovo šedý nádor. Nádor zahŕňa šedú a bielu hmotu. Stlačenie pravej bočnej komory lézií je zrejmé aj pri rovnako viditeľnom posune štruktúr strednej línie.

### **Ďalšie informácie**

Rakovina žalúdka je jednou z najčastejších príčin úmrtia súvisiacou s rakovinou po celom svete. Medzi rizikové faktory patrí mužské pohlavie, strava, fajčenie a chronická infekcia *Helicobacter pylori*. Najbežnejšími miestami pre metastázy adenokarcinómu žalúdka sú pečeň, pobrušnica, pľúca a kosti. Metastázy mozgu sú zriedkavé a vyskytujú sa v menej ako 1% prípadov. Z nich izolované mozgové metastázy sú veľmi neobvyklé a možno ich bežnejšie pozorovať pri šírenom ochorení a sú spojené so zlou prognózou. Paliatívna liečba môže zahŕňať chirurgiu, rádioterapiu, steroidy, chemoterapiu, alebo ich kombináciu.